



Ali Khademi, D.O.
Board Certified
Gastroenterologist

4145 Clares Street
Suite A
Capitola, CA 95010
Phone: 831-662-9999
Fax: 831-662-9998

PREPARACION DE GOLYTELY PARA LA COLONOSCOPIA

EN WATSONVILLE COMMUNITY HOSPITAL
75 Nielson ST. Watsonville, CA 95076

Nombre:

Día del Examen:

Hora de Llegada:

Hora del Procedimiento:

Todos los procedimientos son realizados en el salón de Endoscopia situado en Watsonville Community Hospital. Por favor llame al **831-662-9999** si tiene que cambiar o cancelar su cita 2 días antes (horas de negocio) para evitar un cargo de \$100.

RECUERDE: Usted necesitara una persona que maneje a su casa después del examen debido a que usted tomara un sedante para el examen

7 DIAS ANTES: No tome Hierro, Aspirina, Advil, Motrin, Aleve, Ibuprofen, Pastillas de aceite de pescado, Indocin, o cualquier otro medicamento Anti-Inflamatorio, o medicamentos que adelgacen la sangre. Puede tomar solamente Tylenol si está teniendo algún dolor y puede seguir tomando sus medicamentos regulares que su doctor indique.

- **EL DIA ANTES DEL EXAMEN:**

- Tome la dieta de líquidos claros todo el día. La dieta de líquidos claros consiste del consumo claro como el caldo de pollo (sin pollo o vegetales), café negro (sin crema, leche, o azúcar), té (sin leche), jugos transparentes (manzana), agua, y gelatina amarilla.

NO tome líquidos ROJOS o MORADOS. NO SOLIDOS

- **DE 6 P.M.-8P.M DE LA TARDE:**

- Comience a tomar Golytely: Tome medio galon de Golytely.
- Siga con la dieta de líquidos claros. Tome suficientes líquidos y agua para mantenerse bien hidratado.

NO TOME NADA DESPUES DE LA MEDIA NOCHE (12AM)

- **LA MANANA DEL EXAMEN:**

- **A las 5 de la mañana:** Tomo el resto de su preparativo Golytely.
- No coma o tome nada más que sus medicinas regulares, Solamente que su doctor le indique que no las tome.
- Vaya a "PROCEDIMIENTOS ESPECIALES" en el hospital para registrarse.

FAVOR DE NOTAR:

- Habrá tres diferentes cargos. El cobro del Doctor, el del Hospital, y el Laboratorio si aplica.
- Medicamentos para la Diabetes deberían ser tomados después del procedimiento.