



ALI KHADEMI, D.O

BOARD CERTIFIED GASTROENTEROLOGIST

HEPATOBIILIARY & PANCREATIC DISEASE
SPECIALIST

4145 CLARES STREET

SUITE A


CAPITOLA CA 95010

831-662-9999

FAX: 831-662-9998

PREPARACION DEL INTESTINO PARA LA COLONOSCOPIA CON SUPREP

En Watsonville Community Hospital



Nombre:

Día del Examen:

Hora de Llegada:

Hora del Procedimiento:

Todos los procedimientos son realizados en el salón de Endoscopia situado en Watsonville Community Hospital. Por favor llame al **831-662-9999** si tiene que cambiar o cancelar su cita 2 días antes (horas de negocio) para evitar un cargo de \$100.

7 DIAS ANTES DEL EXAMEN NO TOME: Hierro, Aspirina, Advil, Motrin, Aleve, Ibuprofen, Alcohol, Pastillas de aceite de pescado, Indocin, o cualquier otro medicamento Anti-Inflamatorio, o medicamentos que adelgacen la sangre. Puede tomar solamente Tylenol si está teniendo algún dolor y puede seguir tomando sus medicamentos regulares que su doctor indique.

- **EL DIA ANTES:**

- Tome solamente **líquidos claros** todo el día. La dieta de líquidos claros consiste del consumo como el caldo de pollo (sin pollo o vegetales), café negro (sin crema, leche, o azúcar), té (sin leche), jugos transparentes (manzana), agua, y gelatina amarilla.

NO tome líquidos ROJOS o MORADOS. NO SOLIDOS

- A las 6PM de la noche tome la primera dosis del SUPREP.
- Continúe con la dieta de líquidos claros.
- **NO TOME NADA DESPUES DE LA MEDIA NOCHE (12AM)**

- **EL DIA DEL EXAMEN:**

- A las 5AM de la mañana tome la segunda dosis del SUPREP.
- Y **NO** tome nada más antes del examen.
- **Recuerde que necesitara una persona que maneje a su casa después del examen debido a que usted tomara un sedante para el examen.**
- Vaya a "PROCEDIMIENTOS ESPECIALES" en el Hospital para registrarse.

NOTA:

- Habrá tres diferentes cargos. El cobro del Doctor, el del Hospital, y el Laboratorio si aplica.
- Medicamentos para la Diabetes deberían ser tomados después del procedimiento.

Cuándo tomar el KIT DE PREPARACIÓN INTESTINAL SUPREP

El Kit de Preparación Intestinal SUPREP es ingerido en un régimen de dosis dividida (2 días). Usted toma el primer frasco de 6 onzas de SUPREP la noche anterior a la colonoscopia, y el segundo frasco de 6 onzas de SUPREP en la mañana del día en que se hará el examen. Es importante beber el agua adicional según lo recomendado en las Instrucciones de Uso. Es necesario tomar ambos frascos de 6 onzas para una preparación completa. Su médico le dirá cuándo debe comenzar a tomar cada dosis.

Cómo tomar el KIT DE PREPARACIÓN INTESTINAL SUPREP


- La noche anterior al procedimiento **A LAS 6 PM** (o cuando su médico le indique que comience), complete los pasos 1 a 4 utilizando un (1) frasco de 6 onzas antes de irse a dormir
- En la mañana del día del procedimiento **A LAS 5 AM** repita los pasos 1 a 4 utilizando el otro frasco de 6 onzas

Es necesario tomar ambos frascos de 6 onzas para una preparación completa.

ES IMPORTANTE SEGUIR TODOS LOS PASOS INDICADOS A CONTINUACIÓN.




Pour Vierta **UN** (1) frasco de 6 onzas del líquido SUPREP en el vaso de mezcla.




Agregue agua potable fría hasta la línea de 16 onzas del vaso y mezcle.

NOTA: Asegúrese de diluir SUPREP tal como se indica a la izquierda antes de beberlo.



Beba **TODO** el líquido del vaso



Debe beber dos (2) vasos más de 16 onzas de agua durante la hora siguiente.

NOTA: **Debe** terminar de tomar el último vaso de agua al menos 2 horas antes del procedimiento, o según se le indique